



SAIN Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF, Brasília-DF

CEP: 70.770-915 / Telefone: (61) 3311-9330

E-mail: emater@emater.df.gov.br

#### **Autores:**

Camila Braz Ribeiral Elisa Ribeiro da Cunha Dias

### Diagramação:

Sarah Magri

### **Imagens:**

Camila Braz Ribeiral

## conheça nossos canais

f emater.df @ematerdf ematerdf emater.df.gov.br

















# PRINCIPAIS MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS NA COLETA DE OVOS

A garantia da produção de ovos saudáveis é de fundamental importância para a preservação da qualidade do produto e de seu valor nutricional. Além da obtenção de um alimento seguro para o consumidor final.

A adoção de medidas higiênico-sanitárias na coleta dos ovos também auxilia na viabilização econômica da atividade de avicultura de postura. Ovos limpos e íntegros evitam perdas econômicas e não oneram o custo de produção. Ovos sujos, trincados e impróprios ao consumo trazem prejuízos ao produtor, pois sua comercialização acaba sendo inviabilizada e o produtor assumindo esse prejuízo.

Para uma maior rentabilidade do negócio, citamos abaixo as principais medidas higiênico-sanitárias que o(a) produtor(a) rural deve utilizar em seu galpão aviário. São elas:



Manter a cama do galpão e dos ninhos secas e limpas, efetuando a troca das camas quando necessário.

Figura 01. Ninho com cama de capim seco.

- Espessura ideal de cama do piso e do ninho é de 10cm.
- Ideal ter 1 ninho para cada 4 ou 5 poedeiras.

- 4 Evitar que a ave pernoite dentro do ninho.
- A coleta dos ovos deverá acontecer de maneira tranquila e em horários definidos.
- Para a coleta dos ovos recomendamos bandejas que sejam de fácil higienização e separadas apenas para esse uso.




Figura 02. Ovos em embalagem apropriada para coleta de ovos

- Coletar os ovos de 3 a 6 vezes ao dia.
- B Efetuar o maior número de coletas no período matutino e fazer uma revisão nos ninhos no período da tarde. Já que cerca de 75% das posturas acontecem pela manhã.
- 9 No momento da coleta, o manipulador deve realizar uma pré-classificação, separando os ovos saudáveis, íntegros e limpos dos ovos com algum tipo de dano.



Colocar na bandeja a ponta fina do ovo voltada para baixo.

Figura 03. Ovos com a ponta fina para baixo

Organizar os ovos por data de coleta e manter registros diários.



# **IMPORTANTE**

O registro deve conter quantidade de ovos coletados, data da coleta, situação dos ovos e o nº do galpão no qual o ovo foi coletado. Pode ser utilizado caderno/planilha de campo ou aplicativos para a atividade.

Os ovos impróprios para consumo devem ser descartados. O descarte deve ser preferencialmente em composteira, pois se transformará em adubo orgânico podendo ser aproveitado no próprio piquete de gramíneas das aves.



**Figura 04.** Ovos quebrados e impróprios para comercialização